

Verloop van de test

- Normale duur van de test : 2u (soms 3u naargelang het voorschrift).
- Wij vragen u om eerst een urinestaal af te nemen. Aan de hand van een urinestick zal het suikergehalte in de urine bepaald worden (glycosurie).
 - Indien de glycosurie negatief is, kan de test gestart worden.
 - Indien de glycosurie positief is, kan de hyperglycemietest niet van start gaan. Gelieve uw arts hiervan te verwittigen.
- We voeren een 1^{ste} bloedafname uit vóór de glucose-inname.
- Daarna zal u gevraagd worden om de suikerhoudende oplossing (75g of 100g naargelang het voorschrift) zo snel mogelijk op te drinken in 2 tot 3 minuten.
- Daarna wordt er terug bloed geprikt volgens het voorschrift van de dokter.

Indien u braakt binnen de 30 min na de glucose-inname zal de test afgeschaft worden. In dit geval zal de verpleegkundige u uw voorschrift opnieuw overhandigen en u vragen om zich een andere dag weer aan te melden.

Moet er een afspraak gemaakt worden voor deze test?

Nee

In welk prikcentrum kan ik me aanmelden?

U mag zich begeven naar een van onze prikcentra (zie rubriek “prikcentra - bloedafname”) waar de openingsuren het toelaten om de test uit te voeren volgens het voorschrift van de dokter.

Moet u nuchter zijn voor de test?

Ja, u mag niet eten noch drinken (behalve water) tot 8 uur voor u de test start.

Mag men de ochtendmedicatie innemen?

Bepaalde medicatie kunnen de test beïnvloeden. Indien u medicatie neemt , dient u uw arts te raadplegen.

OGTT en zwangerschap

- De procedure is hetzelfde als hierboven beschreven (uitgezonderd dat de glycosurie niet bepaald wordt).
- 3 bloedafnames zijn voldoende: vóór de inname van de glucose, na 60 min en 120 min.

Centraal Labo Brussel

Humaniteitslaan 116

1070 Brussel

info@lbslab.be

Centre d'activité Seraing

Rue Verte 173

4100 Seraing (Liège)

infocas@lbslab.be

Test O'Sullivan

- De test duurt 1u en u moet niet nuchter zijn.
- De verpleegkundige zal u een suikerhoudende oplossing geven van 50g dat u zo snel mogelijk moet opdrinken in 2 tot 3 minuten.
- Vervolgens zal de bloedafname gebeuren 1u na de inname van de glucose.
- Soms is er een glycemie nuchter gevraagd (in dat geval zijn er 2 bloedafnames nodig : nuchter en 1u na de inname van de glucose).

Opmerkingen

- Gedurende de duur van de test, mag u noch eten noch roken.
- Tijdens de test is het toegestaan één glas water te drinken.
- Het is aangeraden in de wachtzaal te blijven zitten tot de test afgelopen is, daar beweging het glucosemetabolisme verhoogd.
- Indien nodig mag u naar het toilet gaan.
- U dient de verpleegkundige te verwittigen indien u zich misselijk of ziek voelt.

Centraal Labo Brussel

Humaniteitslaan 116

1070 Brussel

info@lbslab.be

Centre d'activité Seraing

Rue Verte 173

4100 Seraing (Liège)

infocas@lbslab.be